

DISTENSION ABDOMINAL Y EDEMAS POR QUISTE DEL CORDON ESPERMATICO

GUILLERMO A. KELLER, CECILIA SESSA

División Clínica Médica, Hospital General de Agudos Donación Francisco Javier Santojanni, Buenos Aires

Resumen La distensión abdominal es un síntoma común, siendo en general la presentación inicial de enfermedades sistémicas o desórdenes gastrointestinales. Otras causas son infrecuentes. Los quistes del cordón espermático son poco frecuentes, pero aún más su ubicación intraabdominal, su tamaño habitual es insuficiente para producir distensión. El paciente presentado en este caso es un varón con criptorquidia bilateral admitido por distensión abdominal, interpretada inicialmente como síndrome ascítico edematoso. La ecografía interpretó la distensión como ascitis tabicada, y la tomografía computada como debida a un gran quiste. En la exploración quirúrgica se diagnosticó un quiste gigante del cordón espermático de ubicación abdominal.

Palabras clave: criptorquidia, ascitis, quiste, cordón espermático

Abstract ***Abdominal distension and edema due to spermatic cord cyst.*** Abdominal distension is a frequent symptom, being often the initial presentation of systemic diseases or gastrointestinal disorders. Other causes are uncommon. Spermatic cord cysts are infrequent, abdominal location is even rarer, and the size of the cysts is usually not enough to produce abdominal distension. In our case a man with bilateral cryptorchidism was admitted with abdominal distension and edema of the lower extremities initially interpreted as ascitic-edematous syndrome. Ultrasonography interpreted abdominal distension as septate ascites, computed tomography as a giant cyst. Exploratory surgery showed a giant spermatic cord cyst in the left spermatic cord.

Key words: cryptorchidism, ascites, spermatyc cord, cyst