


Calcificación bilateral del ligamento sacrotuberoso

Hombre de 71 años que consultó por lumbalgia baja. En la radiografía panorámica de pelvis se observan opacidades en forma de lápiz que se proyectan sobre los agujeros obturadores y se extienden craneal y medialmente hacia el sacro (Fig. 1).

En la reconstrucción de la tomografía computarizada se aprecia banda de densidad cálcica que surge de ambas tuberosidades isquiáticas de los huesos ilíacos, dirigiéndose hacia el borde sacro-coccígeo correspondiente (Fig. 2). Se realizó el diagnóstico de calcificación de los ligamentos sacrotuberosos. El ligamento sacrotuberoso es un estabilizador de la articulación sacroilíaca y conecta la pelvis ósea a la columna vertebral. Es una lámina fibrosa plana, de forma triangular, más fina en el centro que en los extremos. Se origina en las espinas ilíacas posteriores, en la parte lateral del sacro desde S3 hasta las últimas vértebras sacras y dos primeras coccígeas, y se inserta en la tuberosidad isquiática, extendiéndose sus fibras hacia la rama isquiática.

Esta afección puede producir el síndrome de atrapamiento del nervio pudendo y clínicamente manifestarse como dolor perineal crónico.



Ángela Saal^{1,2}, Cecilia R. Abraham¹,
María Virginia Dalmaso¹,

¹Hospital Del Carmen, OSEP, ²Escuela de Medicina Nuclear (FUESMEN), Mendoza, Argentina
e-mail: virdalmaso@gmail.com